

PZN- 0299355

Zusammensetzung Lymphomyosot Tabletten

Die wirksamen Bestandteile einer Tablette zu 301,5 mg sind: Myositis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scordonia D3, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparilla officinalis D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcarea phosphorica D12, Natrium sulphuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levthyroxinum D12, Aranea diadema D6 à 15 mg; Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum iodatum D12 à 30 mg.
Andere Bestandteile (Hilfsstoffe) sind: Laktose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Heel Belgium
B-9031 Drongen (Gent)

Hersteller:

Heel Belgium
B-9031 Drongen (Gent)
Biologische Heilmittel Heel GmbH
D-76532 Baden-Baden
Aut. 982 CH 641 F3

1. Was ist Lymphomyosot Tabletten und wofür wird es angewendet?

Lymphomyosot Tabletten ist ein Homöopathisches Arzneimittel das bei Neigung zur Odembildung und Infektanfälligkeit eingesetzt wird. Bei Drüsen-schwellungen, geschwollene Mandeln und chronische Mandelzundung.

Tabletten
Packung mit 100 und 250 Tabletten.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lymphomyosot Tabletten beachten?**Wann dürfen Sie Lymphomyosot Tabletten nicht anwenden?**

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.
Wann sollten Sie besonders vorsichtig mit Lymphomyosot Tabletten umgehen?

Es sind keine Besonderheiten bekannt, bei denen Sie vorsichtig mit Lymphomyosot Tabletten umgehen sollten.
Bei Anwendung von Lymphomyosot Tabletten mit Nahrungsmitteln und Getränken:

So weit bekannt, kann dieses homöopathische Arzneimittel ohne Bedenken in Kombination mit Nahrungsmitteln und Getränken eingenommen werden.

Schwangerschaft/Stillzeit:

Lymphomyosot Tabletten nicht gebrauchen während die erste 3 Monaten von der Schwangerschaft und während die Brustnahrung.
Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Bezüglich der Fahrtüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen wurden keine Studien ausgeführt.

Bei Anwendung von Lymphomyosot Tabletten mit anderen Arzneimitteln:

Bis heute wurden keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln festgestellt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder in letzter Zeit eingenommen haben, auch wenn es sich dabei um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Lymphomyosot Tabletten anzuwenden?**Falls nicht anders verordnet:**

Dosierung für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre:
Die erste Woche 3 x täglich 3 Tabletten im Mund zergehen lassen, die zweite Woche 3 x täglich 2 Tabletten und die dritte Woche 3 x täglich 1 Tablette.

Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge Lymphomyosot Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten?

Es sind keine Auswirkungen bei einer Überdosis bekannt.

Was ist zu tun, wenn Sie Lymphomyosot Tabletten vergessen haben einzunehmen:

Nehmen Sie auf keinem Fall eine doppelte Dosis Lymphomyosot Tabletten, um die vergessene Dosis einzuhören.

Auswirkungen, die beim Absetzen der Behandlung mit Lymphomyosot Tabletten auftreten können:

Es sind keine Effekte zu erwarten, wenn man die Behandlung von Lymphomyosot Tabletten beendet.

4. Mögliche Nebenwirkungen.

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die Sie als schwerwiegend betrachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

5. Wie ist Lymphomyosot Tabletten aufzubewahren?

Nach dem Gebrauch, die Packung sofort schließen. Das Produkt in der Originalpackung an einen trockenen Platz und nicht über 25 °C aufbewahren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verfallsdatum:
Sie dürfen Lymphomyosot Tabletten nach dem angegebenen Datum auf der Packung, hinter „EXP“, nicht mehr verwenden.

6. Weitere Informationen.

Bitte bringen Sie abgelaufene Arzneimittel zur Apotheke.
Datum der letzten Überarbeitung dieser Gebrauchs-information: Oktober 2011.

-Heel

Patiënteninformatie

062382 A8-11



Lymphomyosot®

Tabletten**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrijf (recept). Toch blijft het belangrijk om Lymphomyosot tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Lymphomyosot tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Lymphomyosot tabletten gebruikt.

3. Hoe wordt Lymphomyosot tabletten gebruikt?

4. Mogelijke bijwerkingen.

5. Hoe bewaart u Lymphomyosot tabletten?

6. Aanvullende informatie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lymphomyosot tabletten:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Lymphomyosot tabletten moet zijn.

Gebruik van Lymphomyosot tabletten in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Er wordt aangeraden Lymphomyosot tabletten niet te gebruiken gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap en gedurende de periode van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Lymphomyosot tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortegeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

3. Hoe wordt Lymphomyosot tabletten gebruikt?**Tenzij anders voorgeschreven:**

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
De eerste week 3 x daags 3 tabletten in de mond laten smelten, de tweede week 3 x daags 2 tabletten en de derde week 3 x daags 1 tablet.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Lymphomyosot tabletten heeft gebruikt:

Er zijn geen gekende symptomen van overdosis.


Wat u moet doen wanneer u Lymphomyosot tabletten bent vergeten te gebruiken:

Gebruik nooit een dubbele dosis van Lymphomyosot tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

EFFECTEN die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Lymphomyosot tabletten wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

-Heel



PZN- 0299355

4. Mogelijke bijwerkingen.

Er zijn geen ongewenste effecten bekend bij het nemen van Lymphomyosot tabletten.
Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Lymphomyosot tabletten?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Het product in de originele verpakking droog en niet boven 25°C bewaren. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Lymphomyosot tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "EXP".

6. Aanvullende informatie.

Brng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2011.

Notice

Lymphomyosot®

Comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 14 jours, consultez un médecin.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Lymphomyosot comprimés et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lymphomyosot comprimés?
3. Comment utiliser Lymphomyosot comprimés?
4. Les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver Lymphomyosot comprimés?
6. Informations supplémentaires.

Composition Spigelon comprimés

Les substances actives d'un comprimé de 301,5 mg sont: Myosotis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparilla officinalis D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcearia phosphorica D12, Tumulus sulphuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levathyroxine D12, Aranea diadema D6 à 15 mg; Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum iodatum D12 à 30 mg.
Les autres composants (excipients) sont: lactose monohydrate, stéarate de magnésium.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché:

Heel Belgium

B-9031 Drongen (Gent)

Fabricant:

Heel Belgium

B-9031 Drongen (Gent)

Biologische Heilmittel Heel GmbH
D-76532 Baden-Baden

Aut. 982 CH 641 F3

1. Qu'est-ce que Lymphomyosot comprimés et dans quel cas est-il utilisé?

Lymphomyosot comprimés est un médicament homéopathique indiqué en cas de tendance à la formation d'œdèmes et sensibilité aux maladies infectieuses. Glandes enflées, hypertrophie tonsillaire et tonsillite chronique.

Comprimés
Emballage de 100 et 250 comprimés.

2. Quel sont les informations à connaître avant d'utiliser Lymphomyosot comprimés?

Quand ne pouvez-vous pas utiliser Lymphomyosot comprimés?
Dans le cas de maladies thyroïdiennes ne pas utiliser sans l'aviso préalable d'un médecin.

Quand devez-vous être prudent avec Lymphomyosot comprimés?

Il n'y a pas des circonstances connues dans lesquelles vous devez faire attention avec Lymphomyosot comprimés.

-Heel

Utilisation de Lymphomyosot comprimés en association avec des aliments ou des boissons:

Jusqu'à présent il n'y a pas de contre-indication à la prise de ce médicament en combinaison avec des aliments ou des boissons.

Grossesse et allaitement:

Il est conseillé de ne pas utiliser les comprimés Lymphomyosot pendant les trois premiers mois de la grossesse et pendant la période d'allaitement.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:
Aucune recherche n'a été faite concernant les effets sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Utilisation de Lymphomyosot comprimés en association avec d'autres médicaments:

Jusqu'à présent aucune interaction de ce médicament avec d'autres médicaments n'est connue. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicament obtenus sans ordonnance.

3. Comment utiliser Lymphomyosot comprimés?**Sauf autre prescription:**

Posologie pour adultes et enfants à partir de 12 ans:
Laissez fondre 3 comprimés dans la bouche 3 x par jour la première semaine, 2 comprimés 3 x par jour la deuxième semaine et 1 comprimé 3 x par jour la troisième semaine.

Que devez-vous faire si vous avez pris plus de Lymphomyosot comprimés que vous n'auriez dû?

Il n'y a pas de symptômes connus en cas de surdosage.

Gebrauchsinformation

Lymphomyosot®

Tabletten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichem Behandlungserfolg zu erzielen, muss Lymphomyosot Tabletten jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Wie ist Lymphomyosot Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lymphomyosot Tabletten beachten?
3. Wie ist Lymphomyosot Tabletten anzuwenden?
4. Mögliche Nebenwirkungen.
5. Wie ist Lymphomyosot Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

-Heel