

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik

Geconcentreerde natriumhypochlorietoplossing

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dakin Cooper 0,5 g/100 ml oplossing voor cutaan gebruik?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Het is een lokaal ontsmettingsmiddel voor gebruik op de huid behorende tot de groep van de chloorverbindingen.

Dakin Cooper is aangewezen bij:

- de verzorging en de ontsmetting van de huid en de slijmvliezen (bijvoorbeeld in de gynaecologie, pediatie en dermatologie);
- de lokale behandeling van wonden en oppervlakkige besmettingen van de huid.

Dakin Cooper wordt ook toegepast in de chirurgie bij de ontsmetting van wonden.

2. WANNEER MAG U DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Dakin Cooper niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- In geval van brandwonden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Dakin Cooper?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Dakin Cooper kan sommige kledingstukken ontkleuren.
- Niet uitdrinken.

- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Kinderen

Dakin Cooper mag gebruikt worden bij kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dakin Cooper nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- Niet tegelijkertijd met andere desinfecterende middelen gebruiken.
- Niet tegelijkertijd met zeep gebruiken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Geen tegenaanwijzingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. HOE GEBRUIKT U DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Dakin Cooper moet onverdund gebruikt worden:

- voor spoeling: het wassen van wonden;
- voor doordrenkte kompressen;
- voor baden: vingerbad, voetbad, zitbad.

De behandeling herhalen naar behoefte.

Gebruik bij kinderen

Dakin Cooper mag gebruikt worden bij kinderen.

Heeft u te veel van Dakin Cooper gebruikt?

Wanneer u te veel van Dakin Cooper heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

In het geval de oplossing toevallig wordt uitgedronken, kan zij een irritatie en aantasting van de slijmvliezen teweegbrengen, vergezeld van pijn en braken. De behandelende geneesheer, die de passende maatregelen zal nemen, dient onmiddellijk verwittigd te worden (tegengif: bicarbonaat (2 tot 5 g) of natriumthiosulfaat (in een 1 tot 2,5 % oplossing).

Bent u vergeten Dakin Cooper te gebruiken?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Dakin Cooper

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Een gevoel van branderigheid of prikkeling kan optreden (in geval van belangrijke wonden of in de gynaecologische chirurgie). Dit heeft geen gevolgen en de behandeling dient niet gewijzigd te worden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
1000 Brussel Madou
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
Tel : (+33) 3 83 65 60 85 / 87
e-mail: crpv@chru-nancy.fr

of

Division de la Pharmacie et des Médicaments
Tel.: (+352) 2478 5592
e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link naar het formulier: <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DAKIN COOPER 0,5 G/100 ML OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Dakin Cooper?

- De werkzame stof in Dakin Cooper is geconcentreerde natriumhypochlorietoplossing (hoeveelheid als actief chloor 0,5 g/100 ml).
- De andere stoffen in Dakin Cooper zijn kaliumpermanganaat - natrium dihydrogeniumfosfaat dihydraat voor pH van 10,5 - gezuiverd water voor 100 ml.

Hoe ziet Dakin Cooper eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dakin Cooper is een geneesmiddel onder de vorm van een oplossing voor cutaan gebruik en is verkrijgbaar in een fles van 60 ml, 250 ml, 500 ml en in een doos met 24 flessen van 250 ml (hospitaalverpakking).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Nederland

Neem voor alle bijkomende informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:

Vemedia Consumer Health Belgium N.V.

Gaston Crommenlaan 8

B-9050 Gent

Tel: +32 9 296 2149

E-mail: contact@vemedia.be

Fabrikant

Cooperation Pharmaceutique Française

2, rue de la Saussaie

F-77310 Saint Fargeau Ponthierry

Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE156195

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2022.