

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

REPARIL 20 mg Maagsapresistente Tabletten

Aescine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat zijn Reparil Maagsapresistente Tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt dit middel ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT ZIJN REPARIL MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Reparil Maagsapresistente Tabletten is een product dat op aders en zwelling inwerkt.

Reparil Maagsapresistente Tabletten kunnen gebruikt worden bij veneuze ziekten: veneuze insufficiëntie, flebitis, aderspat en aderspatverzweringen en bij opstoten van aambeien.

Reparil Maagsapresistente Tabletten kunnen ook gebruikt worden bij zwellingen van traumatische oorsprong (letsels en verwondingen).

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch bent aan Aescine of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter;
- Indien Uw nieren onvoldoende werken of indien u een nierziekte hebt;
- Tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Reparil Maagsapresistente Tabletten inneemt.

- Indien u al andere geneesmiddelen inneemt, gelieve dan de rubriek “ Neemt u nog andere geneesmiddelen in?” te lezen.
- Bij aandoeningen van de aders dient een behandeling met geneesmiddelen vergezeld te worden door andere maatregelen als het dragen van steunkousen, wandelen is aangeraden, enz.
- Indien uw huisarts u in kennis heeft gesteld van intolerantie voor sommige suikers, neem dan contact op met hem vóór dat u dit geneesmiddel inneemt.
- Raadpleeg uw huisarts indien één van de hierboven vermelde waarschuwingen voor u van toepassing zijn, of indien deze in het verleden van toepassing waren.

Kinderen

Bij kinderen onder de 12 jaar zijn Reparil Maagsapresistente Tabletten niet aangewezen.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Reparil Maagsapresistente Tabletten nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Reparil Maagsapresistente Tabletten niet gebruiken zonder doktersadvies indien u orale geneesmiddelen inneemt tegen bloedstolling, noch samen met antibiotica van de groep van de aminoglycosiden of cefalosporinen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Zonder opmerking.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Reparil Maagsapresistente Tabletten is tijdens de zwangerschap gecontra-indiceerd en dient vermeden te worden tijdens de borstvoeding.

Vraag Uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zonder opmerking.

Reparil Maagsapresistente Tabletten bevatten lactose, sucrose en natrium.

Indien uw huisarts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. HOE WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Behalve als de dokter anders voorschrijft worden de maagsapresistente tabletten tijdens of juist na de maaltijd ingenomen.

De aanbevolen aanvangsdosering bij volwassenen is drie maal twee maagsapresistente tabletten daags. Deze dosis zal verminderd worden naargelang de genezing van de aandoening.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Tussen 12 en 14 jaar: de maximale posologie bedraagt 2 à 3 maal daags 1 maagsapresistente tablet

Bij kinderen onder de 12 jaar zijn Reparil Maagsapresistente Tabletten niet aangewezen.

De behandeling dient niet langer dan 3 maanden voortgezet te worden zonder reëvaluatie van de symptomen.

Uw huisarts zal u zeggen hoelang u Reparil Maagsapresistente Tabletten moet innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem bij het gebruik van te hoge dosissen van Reparil Maagsapresistente Tabletten, onmiddellijk contact op met uw huisarts, uw apotheker of het Anti-Gifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is afgeraden om de voorgeschreven behandeling zelf plots stop te zetten, vraag vooraf advies aan uw huisarts of apotheker. Leg hem uit waarom u de behandeling wil stopzetten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zeldzaam en van bij het begin van de behandeling kunnen maagpijn, misselijkheid, pruritus en soms diarree optreden. Deze ongemakken verdwijnen als men minder inneemt. Onderbreken van de behandeling is zelden nodig.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U REPARIL MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Op kamertemperatuur, tussen + 15°C en +25°C, bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof is: aescine.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
 - Lactose 1H₂O – Polyvidone (M39600) – Magnesiumstearaat
 - Omhulling: Sucrose – Talk – Acacia gom – Titaniumdioxide (E171) - Colloïdaal watervrij silicium - Poly(ethylacrylaat, methacrylzuur) 1:1,(M250000) - Macrogol 8000
 - Natriumhydroxide - Natriumcarmellose - Triethylcitraat - Simethicone emulsie - Bijenwas – Carnaubawas. (zie rubriek 2 'Reparil Maagsapresistente Tabletten bevatten lactose, sucrose en natrium')

Hoe zien Reparil Maagsapresistente Tabletten eruit en wat zit er in een verpakking

Dozen met 100 maagsapresistente tabletten voorgesteld in Alu/PVC doordrukstrips met 20 maagsapresistente tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Cooper Consumer Health B.V.

Bijsluiter

Verrijn Stuartweg 60
1112AX Diemen
Nederland

Fabrikant:

Madaus GmbH ; D-51101 Köln; Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE044055

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 08/2024.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2024.