

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **DURATEARS, oogzalf**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is DURATEARS en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is DURATEARS en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

DURATEARS is een oogzalf die droge ogen verzacht.

DURATEARS wordt gebruikt bij volwassenen ter bescherming en als symptomatische behandeling:

- als smeermiddel voor het oog
  - na verwijdering van een vreemd voorwerp uit het oog
  - na een heilkundige ingreep in het oog
  - bij patiënten onder algemene verdoving
- bij droge ontsteking van het hoornvlies, als smeermiddel gedurende de nacht.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Gebruik DURATEARS **uitsluitend** in uw oog (ogen).
- Als u hoofdpijn, oogpijn, veranderingen in uw gezichtsvermogen, irritatie van uw ogen of blijvende roodheid ondervindt, of als uw aandoening verergert of niet verbetert na 3 dagen, stop dan de behandeling en contacteer uw arts.
- **Als u contactlenzen draagt:**
  - Draag geen **contactlenzen** tijdens de behandeling met DURATEARS oogzalf.
  - Verwijder uw contactlenzen voordat u DURATEARS oogzalf gebruikt.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

## Kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van DURATEARS oogzalf bij kinderen is niet vastgesteld.

## Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten tussen elke toediening. Breng uw oogzalf als laatste aan.

Gebruikt u naast DURATEARS nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

## Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken hebben geen invloed op uw behandeling.

## Zwangerschap en borstvoeding

U mag DURATEARS gebruiken wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

## Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u na het gebruik van DURATEARS een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.

**DURATEARS bevat lanoline (wolvet)**, dat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis).

## 3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Contacteer uw arts als uw symptomen verergeren of niet verbeteren na 3 dagen.


Als uw arts u DURATEARS heeft voorgeschreven, zal uw arts u zeggen hoe lang u DURATEARS moet gebruiken. **Stop de behandeling niet voortijdig.**

## De aanbevolen dosering is:

- een kleine hoeveelheid zalf in het aangedane oog (de aangedane ogen) 's avonds, voordat u gaat slapen

Gebruik DURATEARS **uitsluitend** in uw ogen (ogen).

## Wijze van gebruik:



1



2



3

1. **Was uw handen** voordat u DURATEARS gebruikt.

2. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
3. Draai de dop van de tube.
4. **Zorg ervoor dat de punt van de tube niets anders aanraakt**, anders kan de inhoud ervan verontreinigd geraken.
5. Houd uw hoofd achterover.
6. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger totdat er zich tussen het ooglid en het oog een “zakje” vormt (Afbeelding 1). Het sliertje zalf moet hierin komen.
7. Breng de punt van de tube dicht tegen uw oog. Gebruik hierbij de spiegel als dit helpt.
8. Raak uw oog of ooglid, omliggende gebieden of andere oppervlakken niet aan met de punt van de tube.
9. Knijp voorzichtig op de tube om een sliertje zalf naar buiten te duwen in het “zakje” (Afbeelding 2).
10. **Sluit uw oog gedurende enkele seconden** na het aanbrengen van de zalf (Afbeelding 3).
11. Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 10 voor het andere oog. Schroef de dop weer stevig op de tube.

**Als de oogzalf naast uw oog terechtkomt**, probeer het dan opnieuw.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

- DURATEARS mag zo vaak als nodig gebruikt worden, tenzij uw arts u iets anders gezegd heeft.
- Als u meer van DURATEARS **in uw oog** heeft aangebracht dan nodig, wacht dan een aantal minuten totdat de zalf zacht wordt, veeg vervolgens het teveel aan zalf weg uit het onderste ooglid. Zorg ervoor dat u het oog niet aanraakt met uw vingertop of een doekje. Indien nodig, spoel uw oog dan uit met lauw water. Breng geen zalf meer aan tot het tijd is voor uw volgende dosis.
- Wanneer u per ongeluk de inhoud van een volledige tube DURATEARS heeft **ingeslikt**, zou er zich geen enkele bijwerking mogen voordoen. Het is echter aangeraden om het advies te vragen van uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (**070/245.245**).

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Als u bent vergeten uw zalf te gebruiken, gebruik dan de volgende dosis zoals gepland. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en volg uw normale doseringsschema. Breng **geen** extra zalf aan in uw oog om de vergeten dosis in te halen.

**Als u andere oogdruppels of oogzalf gebruikt**, wacht dan minstens 5 minuten tussen de toediening van elk geneesmiddel. Oogzalven moeten als laatste worden toegediend.

#### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Wanneer u de behandeling stopt, kunnen de symptomen van droge ogen terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn met DURATEARS waargenomen. De frequentie ervan kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

- Effecten in de ogen: oogpijn, zwelling van het oog, jeuk in het oog, oogirritatie, abnormaal gevoel in het oog, roodheid van het oog, wazig zicht, ongemak in het oog, verhoogde traanproductie
- Algemene bijwerkingen: hoofdpijn

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via : Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel, Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be), e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be).

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.  
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

### **Gebruik DURATEARS niet langer dan 4 weken na eerste opening.**

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en het doosje na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- Dit middel bevat geen werkzame stoffen.
- De andere stoffen in dit middel zijn watervrije vloeibare lanoline, vloeibare paraffine en witte zachte paraffine (zie rubriek 2).

#### **Hoe ziet DURATEARS eruit en hoeveel zit er in de verpakking?**

DURATEARS oogzalf is een witte tot lichtgele, doorzichtige, homogene zalf, geleverd in een aluminium tube van 3,5 g met een schroefdop.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Alcon NV  
Stationsstraat 55  
B--2800 Mechelen

#### **Fabrikant**

SA ALCON-COUVREUR NV  
Rijksweg 14  
B-2870 Puurs

Alcon Laboratories Belgium  
Lichterveld 3  
B-2870 Puurs-Sint-Amands

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**  
BE 160377

**Afleveringswijze:** Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {05/2020}.**