

Nectadyn

Siroop

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Nectadyn, siroop en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Nectadyn, siroop en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Nectadyn is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt voor de behandeling van heesheid en hoestklachten, zoals droge hoest, prikkelhoest en hoest die gepaard gaat met keelpijn. Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Nectadyn bevat 6 g van een mengsel van sucrose, fructose en glucose per dosis van 10 ml siroop. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

Dit geneesmiddel bevat parahydroxybenzoaten. Deze conserveermiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd). Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nectadyn nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Nectadyn geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken. Voor zover bekend kan Nectadyn gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Nectadyn invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Nectadyn bevat sucrose, fructose, glucose, methylparahydroxybenzoesuur, propylparahydroxybenzoesuur en ethanol.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Nectadyn bevat 6 g van een mengsel van sucrose, fructose en glucose per dosis van 10 ml siroop. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Dit geneesmiddel bevat parahydroxybenzoaten. Deze conserveermiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd). Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen:

De aanbevolen dosering is 10 ml siroop, 3 tot 5 maal daags.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen van 2 tot 6 jaar dient sterk te worden beperkt.

Notice: Information de l'utilisateur

Nectadyn

Siroop

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Nectadyn, sirop et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Nectadyn, sirop ?
3. Comment prendre Nectadyn, sirop ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Nectadyn, sirop ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Nectadyn, sirop et dans quel cas est-il utilisé ?

Nectadyn est un médicament homéopathique contenant des ingrédients traditionnellement utilisés dans le traitement de l'enrouement et des symptômes de la toux, tels que la toux sèche, la toux d'irritation et la toux liée aux maux de gorge.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Nectadyn, sirop ?

N'utilisez jamais Nectadyn

Si vous êtes allergique (hypersensible) aux principes actifs ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Nectadyn contient un mélange de 6 g de saccharose, de fructose et de glucose par dose de 10 ml. Ceci doit être pris en compte chez les patients diabétiques.

Ce médicament contient des parahydroxybenzoates. Ces conservateurs peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

Autres médicaments et Nectadyn

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.



PZN-0299105

Toediening van dit geneesmiddel aan kinderen jonger dan 2 jaar mag slechts uitzonderlijk en alleen na advies van een arts die de te geven hoeveelheid zal bepalen.

Adolescenten van 12 tot 18 jaar:

10 ml siroop, 3 tot 5 maal daags.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

5 ml siroop, 3 tot 5 maal daags.

Kinderen van 2 tot 6 jaar:

2,5 ml siroop, 3 tot 5 maal daags.

De verpakking is voorzien van een maatbeker met een aanduiding voor een dosis van 2,5 ml, 5 ml en 10 ml.

Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid. Na gebruik de maatbeker reinigen met water.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Nectadyn heeft ingenomen, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer er meer Nectadyn werd ingenomen dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten. Wanneer u toch nog vragen heeft, contacteer uw apotheker, arts of het Antigifcentrum (070 245 245).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Tot op heden zijn van Nectadyn geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40

B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De fles zorgvuldig gesloten houden. Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame bestanddelen van 100 g siroop zijn: Baptisia tinctoria D6, Drosera rotundifolia D6, Hydrastis canadensis D6, Ipecacuanha D4, Rumex crispus D4, Sambucus nigra D4 àà 4,8 g. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Sirupus simplex, Mel acacia, Aqua purificata, Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas, Propylenglycolium, Ethanolium.

Hoe ziet Nectadyn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Siroop voor oraal gebruik.

PET fles met maatbeker.

Verpakking van 250 ml siroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv

B-9031 Drogen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

Fax: 09/223 00 76

E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

982 CH 96 F8

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2016.



gie. Si vous avez pris plus de Nectadyn que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez pris plus de Nectadyn que nécessaire, il n'y a pas d'effets secondaires à prévoir. Si vous avez encore des questions, contactez votre pharmacien, votre médecin ou le Centre Antipoisons (070/ 245 245).

Si vous avez oublié de prendre Nectadyn

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Nectadyn

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Jusqu'à présent aucun effet indésirable n'est connu.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Nectadyn, sirop ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le flacon soig-

neusement fermé. A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Nectadyn ?

Les substances actives de 100 g de solution sont : Baptisia tinctoria D6, Drosera rotundifolia D6, Hydrastis canadensis D6, Ipecacuanha D4, Rumex crispus D4, Sambucus nigra D4 àà 4,8 g. Les autres composants (excipients) sont: Sirupus simplex, Mel acacia, Aqua purificata, Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas, Propylenglycolum, Ethanolum.

Qu'est-ce que Nectadyn et contenu de l'emballage

Sirop à administrer par voie orale.
Flacon en PET avec godet doseur.
Emballage de 250 ml de sirop.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium nv
B-9031 Drogen (Gent)
Tél.: 09/265 95 65
Fax: 09/223 00 76
E-mail: info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché
982 CH 96 F8

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est février 2016.

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Nectadyn

Sirup

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Nectadyn, Sirup und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Nectadyn, Sirup beachten?
3. Wie ist Nectadyn, Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nectadyn, Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Nectadyn, Sirup und wofür wird es angewendet?

Nectadyn ist ein homöopathisches Arzneimittel mit Bestandteilen, die traditionell angewendet werden zur Behandlung von Heiserkeit und Hustenproblemen, wie trockener Husten, Reizhusten und Husten, der mit Halsschmerzen einhergeht.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Nectadyn, Sirup beachten?

Nectadyn darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen einen der in Abschnitt 6. genannten Wirk- oder Hilfsstoffe dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte nehmen Sie Nectadyn erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Nectadyn enthält 6 g eines Gemisches aus Sucrose, Fructose und Glucose pro Dosis von 10 ml Sirup. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Parahydroxybenzoesäure (4-Hydroxybenzoesäure). Diese Konservierungsmittel können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen. Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Dosis.

Einnahme von Nectadyn zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Bislang sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Einnahme von Nectadyn zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Soweit bekannt, kann dieses Arzneimittel zusammen mit Speisen und Getränken eingenommen werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Angaben über die Wirkung von Nectadyn auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Stillen vor. Es ist kein Einfluss auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft oder Stillen zu erwarten, angesichts der homöopathischen Verdünnungen der Bestandteile dieses Arzneimittels, die sich bisher nicht als toxisch erwiesen haben. Soweit bekannt, kann Nectadyn während der Schwangerschaft und der Stillzeit in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Informationen bekannt, die darauf hinweisen, dass Nectadyn die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

Nectadyn enthält Sucrose, Fructose, Glucose, Methyl(4-hydroxybenzoat), Propyl(4-hydroxybenzoat) und Ethanol.

Bitte nehmen Sie Nectadyn erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Nectadyn enthält 6 g eines Gemisches aus Sucrose, Fructose und Glucose pro Dosis von 10 ml Sirup. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Parahydroxybenzoesäure (4-Hydroxybenzoesäure). Diese Konservierungsmittel können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen. Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100 mg pro Dosis.

3. Wie ist Nectadyn, Sirup einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung für Erwachsene:

Die empfohlene Dosis beträgt 10 ml Sirup, 3 bis 5x täglich.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren: Die Verabreichung dieses Arzneimittels bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren sollte eingeschränkt werden.

Die Verabreichung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 2 Jahren sollte nur in Ausnahmefällen und nach ärztlichem Rat und einer Empfehlung der Dosis erfolgen.

Jugendliche von 12 bis 18 Jahren:

10 ml Sirup, 3 bis 5 mal täglich

Kinder von 6 bis 12 Jahren:

5 ml Sirup, 3 bis 5 mal täglich

Kinder von 2 bis 6 Jahren:

2,5 ml Sirup, 3 bis 5 mal täglich

Mit dem Produkt wird ein Messbecher geliefert. In diesem können Sie Dosierungen von 2,5 ml, 5 ml und 10 ml abmessen.

Füllen Sie nicht mehr als die verschriebene Dosierungsmenge ab. Spülen Sie den Messbecher nach jedem Gebrauch mit Wasser aus.

Wenn Sie eine größere Menge von Nectadyn eingenommen haben, als Sie sollten

Laut der Homöopathie steht die Wirkung mehr mit dem Verdünnungsgrad als mit der Dosierung im Zusammenhang. Wenn Sie von Nectadyn mehr als die empfohlene Dosis eingenommen haben, wird die Wirkung dadurch nicht verstärkt. Wenn mehr Nectadyn eingenommen wurde als unbedingt erforderlich ist, sind in der Regel keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Wenn Sie noch Fragen haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antifgiftzentrum (070/245.245) auf.

Wenn Sie die Einnahme von Nectadyn vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Nectadyn abbrechen

Es sind keine Wirkungen nach dem Absetzen der Behandlung zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bislang sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 BRUSSEL
Website: www.fagg-afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Nectadyn, Sirup aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. In der Originalverpackung aufbewahren. Die Flasche fest verschlossen halten. Nicht über 25 °C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche und dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Nectadyn enthält

Die Wirkstoffe in 100 g Lösung sind: Baptisia tinctoria D6, Drosera rotundifolia D6, Hydrastis canadensis D6, Ipecacuanha D4, Rumex crispus D4, Sambucus nigra D4 àà 4,8 g. Die sonstigen Bestandteile sind: Sirupus simplex, Mel acacia, Aqua purificata, Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas, Propylenglycolum, Ethanolum.

Wie Nectadyn aussieht und Inhalt der Packung

Sirup zum Einnehmen.
PET Flasche mit Messbecher.
Packung mit 250 ml Sirup

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Heel Belgium nv
B-9031 Drogen (Gent)
Tel.: 09/265 95 65
Fax: 09/223 00 76
E-mail: info@heel.be

Zulassungsnummer

982 CH 96 F8

Abgabestatus

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2016.