

Module 1.3.1.3 - NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V. Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5ml siroop
Variation IB A.2.b. Umbrella branding	Pagina 1 van 4

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank Carbocisteïne

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt U een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Carbocisteïne wordt gebruikt voor zijn slijmverdunnende werking bij aandoeningen van de ademhalingswegen die gepaard gaan met hoest.

2. Wanneer mag u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker niet gebruiken?

- U bent allergisch voor carbocisteïne of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij een actieve maagzweer (gastroduodenaal ulcus).
- Bij fenyketonurie (erfelijke en aangeboren stofwisselingsziekte).
- Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Vraag medisch advies indien de inname van Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker niet tot verbetering leidt. Voorzichtigheid is nodig bij ouderen, als u vroeger zweren in het maagdarmsstelsel had of als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt waarvan gekend is dat ze bloedingen in het maagdarmsstelsel kunnen veroorzaken, of bij langdurig gebruik. Stop met de inname van dit geneesmiddel, indien dergelijke bloedingen optreden. Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker bevat geen sacharose of glucose.

Module 1.3.1.3 - NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V. Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5ml siroop
Variation IB A.2.b. Umbrella branding	Pagina 2 van 4

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker mag gecombineerd worden met een antibioticabehandeling.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

De toediening van Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker wordt afgeraden tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker bevat methylparahydroxybenzoaat

Dit kan allergische reacties (mogelijk vertraagd) veroorzaken.

Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker bevat ongeveer 130 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per 5 ml. Dit komt overeen met 6,5 % van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

3. Hoe gebruikt u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank?

Gebruik Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

- De aangegeven hoeveelheden niet overschrijden:
 - * 2 tot 5 jaar: 5 ml 2 maal per dag, d.i. 500 mg carbocisteïne per dag.
 - * 5 tot 12 jaar: 7,5 ml 2 maal per dag, d.i. 750 mg carbocisteïne per dag.
 - * 12 tot 15 jaar: 15 ml 2 maal per dag, d.i. 1500 mg carbocisteïne per dag.
 - * Volwassenen (vanaf 15 jaar): 30 ml 2 maal per dag, d.i. 3 g carbocisteïne per dag.

Het middel wordt geleverd met een maatbekertje met een maatverdeling op 5 ml / 7,5 ml en 15 ml.

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.

N.B.: De vorm Siroxyl Carbocisteïne kinderen is beter aangepast voor kinderen.

De behandeling moet gemiddeld een tweetal weken worden genomen. Voor sommige chronische aandoeningen is een behandeling gedurende 3 tot 4 weken vereist.

Toedieningswijze en toedieningsweg

Oraal gebruik.

De behandeling met Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker moet worden herzien door uw behandelend geneesheer indien er geen verbetering optreedt na een behandeling gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Heeft u te veel van Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker ingenomen?

Module 1.3.1.3 - NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V. Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5ml siroop
Variation IB A.2.b. Umbrella branding	Pagina 3 van 4

Wanneer u teveel van Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum **(070/245.245)**.

De tekens van overdosering zijn maag- en darmklachten (misselijkheid, braken). Bij een vermoeden van overdosering moet eerst medische hulp worden ingeroepen.

In principe is een opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk.

Bent u vergeten Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker en neem contact op met uw arts of ga rechtstreeks naar een ziekenhuis indien u de volgende symptomen heeft (frequentie niet bekend):

- U heeft een allergische reactie. De tekens kunnen de volgende zijn: huiduitslag (al dan niet met blaarvorming), slik- of ademproblemen, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u één van volgende bijwerkingen heeft:

- Vaak (kan optreden bij minder dan 1 op 10 patiënten): maagpijn, misselijkheid, braken en diarree. Het is dan aangeraden om de hoeveelheid te verminderen. Deze bijwerkingen werden gerapporteerd aan een frequentie van 1.13% en aan 4.26% bij gebruik van placebo.
- Zelden (kan optreden bij minder dan 1 op 1000 patiënten): hoofdpijn, het is dan aanbevolen om de dosering te verminderen.
- Frequentie niet bekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens): bloedingen in het maag-darmstelsel, huidreacties waaronder rode bultjes op de huid, scherp afgegrensd verheven gebied met roodheid en soms blaarvorming, telkens op dezelfde plek. Stop in deze gevallen onmiddellijk de toediening.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en beschermen tegen licht.

Module 1.3.1.3 - NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V. Kareelovenlaan 1 B-1140 Brussel	Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5ml siroop
Variation IB A.2.b. Umbrella branding	Pagina 4 van 4

Niet in de koelkast bewaren.

Gebruik Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker?

De werkzame stof is: carbocisteïne.

De andere stoffen zijn: methylparahydroxybenzoesaat – natriumsacharine – hydroxyethylcellulose – samengesteld aroma 21P087 – natriumhydroxide – gezuiverd water.

Zie ook onder 2. Wanneer mag u Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? “Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker bevat...”.

Hoe ziet Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker is in de handel in volgende verpakking: fles van 125 ml en 300 ml voorzien van een gegradueerd maatbekertje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

MELISANA N.V.
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel

Fabrikant Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank

H2 PHARMA
ZA La Croix Bonnet
21 rue Jacques Tati
F-78390 Bois d'Arcy
Frankrijk

Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen

Siroxyl Carbocisteïne zonder suiker 250 mg/5 ml drank: BE239872

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2024.